Perlatox®
spray
20 ml
con Acido ialuronico*
e Clorexidina

*sotto forma di
ialuronato di sodio

Indicazioni: Perlatox spray orale è un dispositivo medico coadiuvante nell'igiene specifica del cavo orale e della gola. Utile negli stati di irritazione ed arrossamenti delle mucose gengivali ed orofaringee.

Composizione: Aqua, Xylitol, Polysorbate 20, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, Potassium Sorbate, Chlorexidine Digluconate, Sucralose, Melaleuca Alternifolia Oil, Mentha Piperita Oil, Aroma, Bisabolol, Sodium Dehydroacetate, Aloe Barbadensis Gel, Sodium Hyaluronate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Citrus Medica Limonum Oil.

Dosaggio: 1-2 spruzzi, 2-4 volte al giorno o più spesso al bisogno.

Modalità d'uso:
1. Spostare l'erogatore in posizione orizzontale e porre lo stesso in corrispondenza della sede di applicazione;
2. Premere la testa dell'erogatore al fine per far fuoriuscire una quantità predosata e nebulizzata di soluzione;
3. Dopo l'uso, sciacquare accuratamente l'erogatore.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C al riparo da luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Il prodotto in bambini al di sotto dei dodici anni di età va somministrato solo secondo prescrizione del medico o dell'odontoiatra. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso del flacone è personale; l'uso dello stesso flacone da parte di più soggetti, può facilitare la trasmissione di infezioni.

Effetti collaterali: In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifichi, interrompere il trattamento al fine di istituire idonea terapia. Non somministrare in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti; in caso di reazioni indesiderate, sospendere il trattamento e consultare un medico. E' importante segnalare al proprio medico o farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Presentazione: Soluzione in flacone di vetro da 20 ml con erogatore spray direzionale.

Gruppo Farmaimpresa srl
Via Cipro, 1- 25124 Brescia (Italy)

Distribuito da:
ARISTEIA FARMACEUTICI Srl
Via Sant'Elena 151/A
94019 Valguarnera Caropepe (EN)
info@aristeiafarmaceutici.com
www.aristeiafarmaceutici.com

Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.CE.97.1.F01 **Rev.03 04.08.22**